

des plans que les lecteurs sauront apprécier, et au moyen desquels ils pourront se faire une idée exacte des lieux représentés. Nous y ferions même figurer certains costumes orientaux, si nous n'avions à redouter un trop faible encouragement.

Il nous est agréable cependant de déclarer ici que nous avons reçu de nombreuses félicitations à propos de ce récit; on s'accordait de toutes parts à le demander aussi long et aussi détaillé que possible; mais il nous faut répondre à des exigences opposées, et nous nous efforcerons, comme par le passé, de satisfaire les unes et les autres. Il est fort douteux que nous puissions terminer ce récit dans le cours de la présente année.

FAUNE CANADIENNE

HYMENOPTERES

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

(Continué de la page 380 du Vol. XIII).

Gen. MESOCHORUS, Grav., XI, p. 208.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 5 qui suivent :

Abdomen entièrement noir :

Tête noire..... 5. *politus*, n. sp.

Tête jaune..... 1. *atriventris*.

Abdomen plus ou moins jaune ou roux ;

Les 2 premiers segments abdominaux noirs, quelquefois marginés de jaune au sommet ;

Stigma noir ou brun-foncé, avec tache pâle à la base ;

Face noire ; tarière longue..... 6. *humeralis*, n. sp.

Face jaune ; tarière courte.... 7. *luteipes*, n. sp.

Stigma jaune ou jaunâtre sale ;

Tête noire au-dessus des antennes..... 2. *pleuralis*.

Tête jaune au-dessus des antennes..... 4. *flaviceps*.

Abdomen entièrement roux ou avec seulement le 1er segment noir ;

Le scape avec le 1er segment abdominal, noir.. 8. *jucundus*, n. sp

Le scape roux ; abdomen entièrement roux ;

Stigma brun-foncé, avec tache pâle à la base.... 3. **rufulus**.

Stigma jaune-pâle ; aréole grande..... 9. **areolatus**, n. sp.

1. **Mésochore ventre-noir**. *Mesochorus atriventris*, Cress. Can. Ent. iv, p. 21, ♀.

La description donnée à la page 208 a été, par erreur, prise sur un autre insecte ; elle doit être remplacée par la suivante.

♀ — Long. .25 pce. Noir ; tête et thorax brun-foncé ; les mandibules, les palpes, les orbites antérieurs, jaune-pâle. Antennes longues, brunâtres. Ailes hyalines ; stigma jaune-brunâtre, les nervures brunes ; aréole grande, en carré oblique, subpédiculée. Pattes jaune miel, y compris les hanches ; les jambes postérieures plus pâles, leur extrémité noire, de même que l'extrémité des articles de leurs tarses. Abdomen linéaire, poli, brillant, noir, les sutures quelque peu roussâtres, l'extrémité épaissie et comprimée ; tarière du quart de la longueur de l'abdomen, ses valves noirâtres, aplaties, larges.—R.

5. **Mésochore poli**. *Mesochorus politus*, nov. sp.

♀ — Long. .15 pce. Noir, poli, brillant ; les mandibules, les écailles alaires avec les hanches antérieures, blanc ; les flancs avec les pattes, roux-jaunâtre. Face finement ponctuée, légèrement convexe au milieu. Antennes très longues, brun-foncé. Thorax subcylindrique, poli, brillant, noir avec les flancs roux. Ailes hyalines, iridescentes, le stigma d'un jaune sale, l'aréole très grande, sessile, en losange. Pattes roux-pâle, les jambes postérieures avec un petit anneau noir à l'extrémité. Abdomen linéaire, convexe, poli, brillant, la suture entre les segments 2 et 3 plus ou moins roussâtre, le ventre blanchâtre, le 5e segment prolongé en une grande écaille jaunâtre dépassant un peu le dernier segment ; tarière moins du quart de l'abdomen, ses valves larges, polies, noires.—C.

Peut-être la ♀ de l'*atriventris*, Cress. ?

6. **Mésochore-à-épaules-rousses**. *Mesochorus humeralis*, nov. sp.

♀ — Long. .18 pce. Noir, poli, brillant ; le chaperon, les mandibules, le scape en dessous, les écailles alaires avec une large bande en dessous, et toutes les pattes, jaune roussâtre. Face noire, brillante. Antennes filiformes, plus courtes que le corps, jaunâtres en dessous à la base. Thorax épais, poli, brillant, une bande jaune-roussâtre partant des écailles alaires couvre tout le prothorax en dessous. Ailes hyalines, le stigma grand, noir avec une petite tache brune à chaque

extrémité, l'aréole petite, en carré oblique. Les jambes postérieures obscures à l'extrême base et à l'extrémité, leurs tarses aussi plus ou moins obscurs. Abdomen allongé, plus épais à l'extrémité, noir, le sommet du 2e segment avec le 3e roux-jaunâtre, le premier très long, finement ponctué, le reste poli, brillant ; tarière de la moitié de l'abdomen environ.—R.

7. Mésochore pieds-jaunes. *Mesochorus luteipes*, Cress
Can. Ent. iv, 22 ♀.

♀—Long. .18 pce. Noir, brillant ; la face, les joues, les orbites postérieurs, avec les écailles alaires, blanc. Antennes grêles, aussi longues que le corps, brunes, jaunâtres à la base en dessous. Les épaules jaune-roussâtre. Ailes hyalines, iridescentes, stigma brun-pâle, aréole grande, en losange. Pattes jaunes y compris les hanches et les trochantins, les cuisses postérieures légèrement teintées de brun, leurs jambes noires à la base et à l'extrémité. Abdomen plus épais à l'extrémité, poli, brillant, les segments 1 et 2 noirs, les autres jaunâtres avec teinte de brun ; le ventre jaune ; la tarière forte, courte, noire.—R.

8. Mésochore agréable. *Mesochorus jucundus*, nov. sp

♀—Long. .27 pce. Roux avec taches noires ; la face avec les 4 pattes antérieures, plus pâles. Antennes longues, sétacées, noires, y compris le scape. Thorax robuste, une grande bande noire sur chaque lobe du mésothorax avec deux taches de même couleur de chaque côté du métathorax. Ailes hyalines, le stigma noir, l'aréole rhomboïdale, sessile. Les jambes postérieures légèrement obscures à l'extrémité. Abdomen arqué, robuste ; noir sur le premier segment excepté à la base, le ventre jaune, le 5e segment avec une écaille dépassant l'abdomen ; tarière noire, forte, du quart de l'abdomen environ.—R.

Les taches noires de son thorax le distinguent surtout du suivant.

9. Mésochore a-grande-aréole. *Mesochorus areolatus*,
nov. sp.

♀—Long. .21 pce. D'un beau jaune-miel dans toutes ses parties. Les antennes très longues, grêles, un peu plus obscures à l'extrémité. La face avec les pattes plus pâles que le reste. Thorax robuste, sans aucune tache. Ailes hyalines, le stigma jaune pâle, l'aréole très grande, en losange, sessile. Abdomen robuste, arqué, son extrémité légèrement obscurcie, dépassée par l'écaille ventrale ; la tarière courte, forte, roussâtre, obscure à la base.—R.

Une plus forte taille et son stigma jaune le distinguent surtout du *melleus*, Cress. ainsi que du *rufulus*, Prov.

Gen. PLECTISCUS, Grav. XI, p. 210.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

Stigma brun ; tarière aussi longue que l'abdomen. 1. *gracilis*.
Stigma jaune-pâle ; tarière plus courte que l'abdomen. 2. *niger*, n. sp.

2. **Plectisque noir.** *Plectisc s niger*, nov. sp.

♂ ♀ — Long. 10 pce. Noir sans aucune tache, poli, brillant ; le chaperon, les mandibules, les écailles alaires, blanc. Antennes longues, filiformes, brunâtres à la base. Thorax court et assez robuste, oblique en arrière. Ailes hyalines, iridescentes, le stigma brun-jaunâtre, l'aréole en losange, sessile. Pattes jaune-pâle, les hanches postérieures noires à la base ♀, entièrement noires ♂, leurs jambes et leurs tarses plus ou moins obscurs. Abdomen en massue, entièrement noir ; tarière de la moitié de l'abdomen environ. Dans le ♂ le 3^e segment abdominal est plus ou moins marginé de roux au sommet.—PC.

Après le Genre PLECTISCUS, Grav., XI, p. 210, ajoutez le suivant.

Gen. CYRTOCENTRE. *Cyrtocentrus*, nov. gen.

Tête assez courte, transversale. Antennes filiformes, assez courtes. Thorax court, robuste, le mésothorax sans divisions distinctes, le métathorax très court ; écusson proéminent. Ailes avec une aréole subquadrangulaire, irrégulière, la cellule radiale courte et large. Pattes médiocres, les postérieures à peine plus longues que les autres. Abdomen assez court, subsessile, en ovale allongé, déprimé sur le dos et légèrement comprimé à l'extrémité, le premier segment s'élargissant de la base au sommet ; tarière dépassant à peine le dernier segment abdominal, et cependant recourbée sur le dos à son extrémité.

Ce genre, voisin des Plectisques, s'en distingue surtout par la forme de sa tarière, laquelle, suivant le bord du dernier segment abdominal, se recourbe sur le dos à sa pointe. Une seule espèce rencontrée.

Cyrtocentre de-Québec. *Cyrtocentrus Quebecensis*, nov. sp.

♀—Long. .20 pce. Noir avec les pattes jaunes ; les palpes, le scape avec les écailles alaires, jaune-pâle. Face finement ponctuée, avec une protubérance tuberculeuse au milieu, le chaperon poli, brillant. Antennes filiformes, plus courtes que le corps, noires avec les 2 articles de la base jaunes. Thorax poli, brillant, le métathorax avec lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, les nervures noires, pâles à la base, le stigma noir ; aréole subquadrangulaire, irrégulière, un peu oblique. Pattes jaunes y compris les hanches et les trochantins, l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarses plus ou moins obscurs. Abdomen subsessile, poli, brillant, déprimé, ovalaire, noir, les segments 2 et 3 obscurément marginés de jaune au sommet ; le ventre jaune de même que la tarière, celle-ci courte, redressée sur le dos, dépassant à peine l'épaisseur du dernier segment de l'abdomen.

Capturé au CapRouge et à St-Hyacinthe.

Gen. CERATOSOMA, Cress. XI, p. 211.

Ceratosoma rufa, Prov. décrite sous le nom d'*Exetastes rufa*, Prov. p. 213.

Gen. EXETASTES, Grav. XI p. 211.

L'espèce 6, *E. Brevipennis*, est le *Mesostenus brevipennis*, Prov., et l'espèce 8, *E. rufus*, est la *Ceratosoma rufa*, Prov.

Gen. MESOLEPTUS, Grav. XI, p. 221.

Aux 26 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes, dont la dernière est nouvelle.

27 *Mésolepte voyageur*. *Mesoleptus peregrinus*, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. ii, p. 102, ♂ ♀.

♂—Long. .30 pce. Noir brillant ; les mandibules, les 2 articles basilaires des antennes, les écailles alaires avec les pattes, blanc. Antennes plus courtes que le corps, noires. La face à pubescence argentée. Le prothorax, le mésothorax avec l'écusson, d'un roux brillant, le lobe médian du mésothorax noir ; le métathorax à lignes soulevées formant une aréole centrale longue et étroite. Ailes hyalines, le stigma noir, l'aréole petite, subpentagonale, la 2^e récurrente courbée en dehors. Pattes longues et grêles, blanches, les postérieures brunes avec leurs hanches roussâtres. Abdomen très grêle, linéaire, allongé, noir, le 3^e segment avec les suivants marginés de roux au sommet, le premier fort long et à peine plus large à l'extrémité.—R.

Voisin du *muliebris*, Cress. mais s'en distingue surtout par ses flancs sans taches.

28. Mésolepte variable. *Mesoleptus variabilis*, nov. sp.

♀—Long. .23 pce. Noir, opaque ; les mandibules, le chaperon une grande tache au-dessus mais n'envahissant point les orbites, le scape en dessous, les écailles alaires, l'écusson avec les 4 trochantins antérieurs, blanc. Antennes très longues, noires avec un anneau pâle au delà du milieu. Ecusson proéminent, blanc, roussâtre à la pointe ; métathorax finement ponctué, sans lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, le stigma brun-roussâtre, l'aréole triangulaire, oblique, assez grande. Pattes rousses, les hanches antérieures noires à la base, blanches à l'extrémité, l'extrémité des cuisses postérieures et de leurs jambes, noir. Abdomen fusiforme, roux, noir à la base et à l'extrémité, le premier segment s'élargissant de son milieu au sommet ; tarière à peine sortante.—R.

Voisin de *l'honestus*, Cress., mais s'en distinguant surtout par son thorax entièrement noir.

Gen. ECLYTUS, Holmg. XI, p. 250.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Eclyte robuste. *Eclytus robustus*, nov. sp.

♀—Long. .30pce. Noir, poli, brillant ; la face, les mandibules, les palpes, les écailles alaires, une ligne en avant, une tache sur les bords latéraux du mésothorax avec le ventre, blanc. Antennes brunes, plus pâles en dessous, le scape obscurément taché de blanc. Ecusson proéminent, le métathorax finement ponctué avec 2 carènes longitudinales rapprochées sur le disque. Ailes hyalines, sans aréole, la 3e cellule discoïdale dépassant considérablement la grande cellule ; stigma noir, taché de blanc à la base. Pattes roux-clair y compris les hanches, les jambes postérieures avec leurs tarses, noir plus ou moins foncé. Abdomen allongé, cylindrique, rétréci à la base, le premier segment canaliculé, les terminaux marginés de blanc ; tarière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Après le genre TRYPHON. Grav. p. 252, ajoutez le suivant.

Gen. EXENTERUS. *Exenterus*, Hartig.

Tête transversale, courte et large ; antennes moins longues que le corps, filiformes, un peu plus épaisses au milieu. Thorax court et robuste. Ailes avec une aréole triangulaire. Pattes courtes, cuisses à peine renflées, les 4 jambes postérieures sans éperons, les crochets des tarses

simples. Abdomen sessile, son premier segment rugueux, subcylindrique, un peu plus épais à l'extrémité.

Ce genre, qui a été détaché des Tryphons, s'en distingue surtout par l'absence d'éperons aux jambes postérieures, ses crochets simples empêche de le confondre avec les *Cteniscus*. Une seule espèce rencontrée.

Exentère du Canada. *Exenterus Canadensis*, sp. nov.

♂ ♀ — Long. .30 pce. Noir, le chaperon, la face excepté une ligne longitudinale au milieu, le scape, une ligne sur les côtés du mésothorax, une autre au-dessous de l'insertion des ailes, une autre de chaque côté sur le bas du prothorax, l'écusson et le post-écusson, un point de chaque côté du métathorax, les pattes avec une ligne au sommet des segments abdominaux, jaune. La tête et le thorax densément ponctués, le métathorax rugueux. Ailes légèrement obscures, le stigma brun, l'aréole triangulaire, pédiculée. Pattes jaunes, les hanches noires, les 4 antérieures jaunes en dessous, les 4 cuisses antérieures noires en dessus de même que l'extrémité de leurs jambes. Abdomen fortement ponctué, les 2 segments basilaires rugueux, le premier avec 2 carènes sur le disque ; tarière non apparente.

Capturé à Danville, comté de Richmond, voltigeant autour d'un pin que ravageaient des larves d'hyménoptères que nous avons lieu de croire être celles de *Lophyrus*.

Gen. MESOLEIUS, Holmg. XI, p. 257.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

6. **Mésoloi noir.** *Mesoleius niger*, nov. sp.

♀ — Long. .17 pce. Noir ; les mandibules, l'extrémité de jones, les écailles alaires, un point en avant, un autre en dessous, les trochantins, les 4 tarsi antérieurs excepté à l'extrémité, avec l'extrémité des hanches, jaune-pâle. Face finement ponctuée, soulevée longitudinalement au milieu. Antennes noires, aussi longues que la tête et le thorax réunis. Métathorax à carènes renfermant une aréole en carré à sa base ; écusson avec une profonde excavation à sa base bordée latéralement par une carène. Ailes passablement enfumées, les nervures et le stigma noir, aréole pétiolée, subtriangulaire, incomplète, sa nervure extérieure manquant. Pattes d'un beau fauve clair, les hanches noires, blanches à l'extrémité, les tarsi postérieurs avec l'extrémité de leurs jambes, noir. Abdomen entièrement noir, en ovale allongé, le premier segment avec 2 carènes, finement ponctué, brillant, les autres plus grossièrement ponctués à terminaux avec poils grisâtres.

Espèce bien remarquable par son absence de taches et ses ailes enfumées.

7. Mésoloi à-jointure-blache. *Mesoleius junctus*, n. sp.

♂—Long. .18 pce. Noir; une tache sur les mandibules, une tache au milieu de la face au dessous de l'insertion des antennes, les écailles alaires, une petite ligne au dessous, les bords supérieurs du prothorax, une tache en crochet sur les lobes latéraux du mésothorax, une ligne à l'insertion des ailes, la suture des flancs entre le méso et le métathorax, une tache sur l'écusson, une ligne sur le post-écusson, avec les trochantins, blanc. Face large, très finement ponctuée. Antennes noires. Métathorax arrondi, sans lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, sans aréole, le stigma brun foncé avec un point blanc à la base. Pattes roux-clair, les jambes postérieures avec les tarses et l'extrémité des cuisses, noir, les jambes avec un anneau blanc à la base suivi d'une teinte plus ou moins rousse. Abdomen sessile, le 1er segment lisse, un peu plus large au sommet, le 2e avec quelques aciculations à la base et obscurément roussâtre, le reste noir.

Espèce bien reconnaissable par la suture blanche de ses flancs.

Gen. **ERRONEMUS**, Holmg. XI p 265.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Erronème marginé. *Erronemus marginatus*, nov. sp.

♀ — Long. .25 pce. Noir; les mandibules, les écailles alaires, les palpes, blanc ou jaune-pâle; le chaperon, avec les pattes y compris les hanches et les trochantins roux-pâle ou jaune-miel. Antennes noires, plus courtes que le corps. Thorax court et épais; l'écusson proéminent et caréné, le métathorax à lignes soulevées distinctes, subépineux aux angles. Les tarses postérieures avec l'extrémité de leur jambes brunâtres. Abdomen subsessile, en ovale allongé, poli, brillant, le premier segment avec 2 carènes sur son disque confluentes au sommet, tous les autres finement marginés de roux au sommet; tarière en forme de fort éperon redressé, mais ne dépassant pas le dessus du dernier segment.

Capturé au CapRouge.

Gen. **BASSUS**, Fabr. XI, p, 272.

Aux 14 espèces décrites, ajoutez les 4 suivantes. La 1ère, voisine de *l'agilis*, s'en distingue par son 3e segment abdominal sans tache à la base; les 3 autres se distinguent comme suit de *Pichneumonoides* :

Orbites antérieurs pâles :

Segments abdominaux 2 et 3 ceinturés de
roux 14. *ichneumonoides*.

Segments 2 et 3 entièrement roux. 16. *cingulatus*. n. sp.

Orbites antérieurs noirs :

Une tache pâle au milieu du front. . . . 17. *elongatus*,

Point de tache au milieu du front. 18. *longicornis* n. sp.

15 *Basse-à-épaulette* 3. *Bassus scipulatus*, nov. sp.

♀ — Long. .20 pce. Noir ; robuste, le chaperon, les mandibules, de larges lignes orbitales, les écailles alaires avec une ligne en avant et une tache sur les bords latéraux du mésothorax, une tache sur l'écusson avec les hanches antérieures, blanc. Antennes filiformes, assez fortes ; écusson proéminent ; métathorax fortement ponctué. Ailes hyalines, sans aréole, le stigma noir. Pattes rousses ; les postérieures avec l'extrémité des jambes et les tarses brun foncé. Abdomen robuste, déprimé à la base et comprimé à l'extrémité, les segments 2 et 3 avec une ligne jaune-pâle au sommet de chaque côté.—R.

Voisin de l'*agilis*, mais sans tache à la base du 3e segment ; sa taille aussi plus robuste.

16. *Basse ceinturé-de-roux*. *Bassus cingulatus*, nov. sp.

♀ — Long. .20 pce. Noir, poli, brillant, avec une bande rousse à l'abdomen. Le chaperon, les mandibules, les palpes, de larges orbites antérieurs, les écailles alaires, un point en avant avec une tache sur le bord du prothorax, l'extrémité des hanches antérieures avec tous les trochantins, jaune-pâle. Antennes filiformes, noires, plus longues que le corps ; écusson proéminent. Thorax robuste. Ailes hyalines, sans aréole, le stigma noir. Pattes roux-clair, les hanches noires avec l'extrémité jaune, tarses postérieurs bruns. Abdomen large, déprimé, le premier segment rugueux, les segments 2 et 3 roux, le reste noir ; tarière courte,—R.

Voisin par sa forme du *saginitus*, mais sans impressions à l'abdomen

17. *Basse allongé*. *Bassus elongatus*, Prov. Nat. vi, p. 57, ♂.

♀ — Long. .19 pce. Noir, poli, brillant ; les mandibules, une tache au milieu de la face au dessous des antennes, les écailles alaires, un point en avant, une petite ligne au dessous, une ligne sur les bords latéraux du mésothorax, tous les trochantins avec l'extrémité des hanches, jaune-pâle. Antennes assez fortes, brun foncé, le scape plus

ou moins taché de jaune au sommet. Ailes hyalines, iridescentes, sans aréole, le stigma brun avec une tache pâle à la base. Pattes rousses, les hanches noires, jaunes à l'extrémité, les 4 cuisses antérieures avec une ligne noire en dehors. Abdomen avec le premier segment large, caréné sur ses côtés au sommet, rugueux de même que la moitié basilaire du 2e, le sommet de celui-ci, avec le 3e plus ou moins complètement et quelquefois aussi la base du 4e, roux, le reste noir.

♂—Avec la face, le scape en dessous, une ligne verticale au dessus des hanches antérieures, les 4 hanches antérieures, jaune-pâle.

Après avoir décrit cette espèce sous son nom propre, nous l'avons ensuite donnée comme variété de *Pichneumonoides*, mais la confrontation d'un grand nombre de spécimens capturés depuis ne nous laisse plus de doute sur son identité comme espèce distincte. Elle se distingue surtout de *Pichneumonoides* par une taille moins robuste, plus allongée, les orbites antérieurs et le labre toujours noirs et la tache médiane de sa face que nous avons constamment trouvée dans 10 spécimens ♀ que nous avons examinés.

18. Basse longues-cornes. *Bassus longicornis*, nov. sp.

♀—Long. .19 pce. Taille élancée, grêle, corps noir, poli, brillant; le labre, les mandibules, le scape en dessous, un point en avant, une ligne au dessous, tous les trochantins avec les 4 hanches antérieures, jaune-pâle. Antennes fort longues, à articles allongés, brunes, plus claires en dessous. Métathorax avec carènes formant une aréole en carré à la base. Ailes hyalines, les nervures pâles à la base, le stigma jaune-pâle, plus clair à la base. Pattes roux-clair, les tarses postérieurs brunâtres. Abdomen à premier segment beaucoup plus long que large, aciculé avec la moitié basilaire du 2e, le sommet de celui-ci, avec le 3e et partie du 4e roux, le reste noir, les segments médians sans impressions transversales.

Bien distinct des deux précédents, diffère surtout de *Pichneumonoides* par ses orbites noirs, et de *elongatus* par son labre jaune. Examiné 9 spécimens.

Gen. CHORINÆUS. Holm. XI, p. 278.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

Chorinée beaux-pieds. *Chorinæus pulchripes*, nov. sp.

♀—Long. .30 pce. Noire, les mandibules, les écailles alaires, une ligne au dessous avec les jambes, blanc ou jaune-pâle. Antennes

fortes, filiformes, noires, plus courtes que le corps. Thorax gibbeux en avant, le métathorax avec lignes soulevées formant une aréole en carré sur le disque. Ailes légèrement enfumées, les nervures et le stigma, noir ; aréole triangulaire, subpédiculée. Pattes noires, les 4 cuisses antérieures terminées de jaune-pâle, les jambes antérieures blanches, les 4 autres blanches à la base et noires à l'extrémité, les tarses noirs. Abdomen ponctué, allongé, en massue à l'extrémité, le 1er segment avec ses 2 carènes du disque confluentes au sommet, le 3e avec une carène médiane, le 2e avec une carène médiane seulement au sommet, cette carène se divisant en 2 à la base pour former une espèce d'alvéole allongée ; tarière non sortante.

Capturée à Chicoutimi.

Gen. ORTHOCENTRUS, Grav. XI, p. 378.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez la suivante.

6. *Orthocentre face-blanche.* *Orthocentrus albofaciatus*, nov. sp.

♀ — Long. .22 pce. Grêle, noir ; toute la face avec des lignes orbitales jusque sur le vertex, le scape des antennes en dessous, les joues, le prothorax, les écailles alaires avec une tache en avant, les 4 hanches antérieures, les trochantins, la poitrine audessus des hanches de devant, blanc. Le chaperon étroit et fortement convexe. Antennes fort longues, noires, à scape court et fortement renflé. Métathorax finement ponctué, sans lignes soulevées bien distinctes ; les flancs et la poitrine, blanc plus ou moins lavé de roux clair. Ailes hyalines, longues, sans aréole, le stigma brun-foncé. Pattes longues et grêles, roux clair, les hanches postérieures plus ou moins maculées de noir en dessus, leurs jambes noires dans leur moitié apicale, leurs tarses aussi noirs. Abdomen allongé, grêle, noir, les segments médians d'un roux sale, le premier segment allongé, grêle, avec les tubercules stigmatiques vers son milieu ; tarière courte, mais saillante.

Espèce bien remarquable par sa face blanche, le scape de ses antennes gonflé, son chaperon convexe, etc.

Gen. CLISTOPYGA, Grav. xii, p. 46.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. *Clistopyge tronquée.* *Clistopyga truncata*, nov. sp.

♀ — Long. .25 pce. Noire, les palpes, les écailles alaires avec les trochantins, blancs. Antennes médiocres, grêles ; thorax finement ponctué, le mésothorax sans divisions distinctes, le métathorax court, annuliforme, taché de roux sur les côtés, tronqué presque carrément en

arrière. Ailes légèrement enfumées, sans aréole, les nervures et le stigma noir. Pattes rousses y compris les hanches, les cuisses postérieures noires à l'extrémité, leurs jambes blanches avec un anneau noir au-dessous de la base et l'extrémité aussi noire, leurs tarses noirs excepté à la base du 1er article. Abdomen robuste, convexe, large, fortement ponctué, avec des impressions formant des espèces de tubercules sur les côtés, les segments terminaux entiers; tarière forte, de la longueur de l'abdomen environ.

Un seul spécimen ♀ pris à Chicoutimi.

Gen. GLYPTA; Grav. XII, p. 65.

Aux 6 espèces décrites, ajoutez la suivante

7. *Glypte ruguleuse*. *Glypta rugulosa*, nov. sp.

♂.—Long. .20 pcc. Noire, le chaperon, les mandibules, les palpes avec les écailles alaires, blanchâtres. Pattes y compris les hanches, jaune-roussâtre, les antérieures plus claires. Tête courte, à face renflée pour l'insertion des antennes, celles-ci longues, brunes, brun-roussâtre en dessous. Ailes hyalines, à aréole triangulaire, le stigma brun-roussâtre. Abdomen allongé, linéaire, ponctué-rugueux, entièrement noir, les lignes obliques peu prononcées.—R.

Ses pattes entièrement rousses la distinguent surtout de la *Canadensis*, et des espèces voisines.

Gen. LAMPRONOTA, Curtis, XII, p. 70.

2. *Lampronota jocosu*, Cress. ♂ p. 71.

♀—Noire; face noire avec 2 lignes orbitales blanches au-dessus de l'insertion des antennes se continuant jusque sur le vertex. Aréole petite, triangulaire, subpédoncée. L'extrémité des cuisses postérieures, leurs jambes excepté à la base, avec leurs tarses, brun-foncé. Tarière presque aussi longue que le corps.

Pris plusieurs spécimens au CapRouge.

12. *Lampronota humeralis*, Prov. ♂ p. 75,

♀—La face, le scape, le prothorax, noir; 2 lignes orbitales sur le vertex, avec la bouche et les écailles alaires, blanc; flancs noirs; métathorax en partie roux. Tarière plus longue que l'abdomen. Pour le reste semblable au ♂.

14. *Lampronota Americana*, Cress. ♀ p. 76.

♂—Le chaperon, les mandibules, les côtés de la face avec une tache sur les écailles alaires, blanc; les 4 pattes antérieures rousses, leurs hanches noires, leurs trochantins blancs; les postérieures noires avec la base des jambes rousses. Abdomen noir à la base et à l'extrémité.

Gen. ARENETRA, Holm XII, p. 77.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

Arénète noirette. *Arenetra nigrita*, Walsh. Trans. Am. Ent. Soc. iii, p. 159, ♀♂.

♂—Long. .40 pce. Noire; la tête, le thorax et la base de l'abdomen avec une pubescence grisâtre longue mais peu dense, cette pubescence plus dense sur la tête et les flancs. Thorax court, gibbeux en avant; les écailles alaires noires. Ailes légèrement enfumées, les nervures noires; aréole triangulaire, subpétiolée. Pattes noires, les genoux, les jambes et les tarses d'un roux brunâtre. Abdomen atténué aux 2 extrémités, le 1er segment finement rugueux transversalement, les terminaux polis, le 4e et les suivants finement marginés par une ligne pâle.

♀—Avec les cuisses antérieures brun-roussâtre; la tarière environ de la moitié de l'abdomen en longueur.

Diffère surtout de la *Canadensis*, Cress. par sa pubescence blanchâtre et non noire.

Gen. MENISCUS, Schiodte XII, p. 78.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Ménisque marginé *Méniscus marginalus*, nov. sp.

♀—Long. .30 pce. Noir; la face noir-foncé sans aucune tache; antennes brun-foncé, plus courtes que le corps. Thorax court et épais, les écailles noires. Ailes hyalines, les nervures noires, blanches à la base; aréole subrhomboidale, noire, blanche à la base. Pattes rousses, y compris les hanches et les trochantins; les jambes postérieures noires avec un anneau blanc près de la base, leurs tarses aussi noirs, tachés de blanc à la base du 1er article. Abdomen fort, lisse, très finement ponctué, tous les segments finement marginés de roux au sommet; tarière forte, plus courte que l'abdomen.

Capturé à Québec par M. l'abbé Huart.

Gen. ECHTHRUS, Grav. XII, p. 97.

Aux 6 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Echthrus nigricornis. Prov. p. 486; ci suit la description de la ♀.

♀—La face noire; le scape des antennes brunâtre en dessous. L'extrémité des cuisses postérieures avec leurs jambes et leurs tarses, noir. Tarière grêle, de la longueur de l'abdomen environ.

7. *Echthre* pattes-rousses. *Echthrus rubripes*, nov. sp.

♀—Long. .25 pce. Noir avec les pattes rousses ; les mandibules tachées de roux. Antennes de longueur moyenne, brunes. grêles, à articles allongés. Thorax robuste, finement ponctué, le métathorax à lignes soulevées distinctes, tronqué carrément en arrière avec un mucron aux angles. Ailes iridescentes, légèrement enfumées, à nervures noires. sans aréole. Ecailles alaires blanches, Pattes d'un beau roux y compris les hanches, les postérieures avec les tarses et l'extrémité des jambes, brun-foncé. Abdomen en ovale, à pédicule grêle, élargi au sommet, finement ponctué ; tarière de la longueur de l'abdomen.

Voisin du *nigricornis* mais s'en distinguant surtout par la forme de son métathorax et son absence d'aréole aux ailes.

Fam. des BRACONIDES, Vol. XII, p. 130.

Gen. BRACON, Fabr, XII, p. 136.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante :

18. *Bracon* net. *Bracon nilidus*, nov. sp.

♂ ♀—Long. .16 pes. Noir, poli, brillant ; la bouche, le scape en dessous, les pattes avec une bande sur l'abdomen, jaune roux. Thorax sans aucune tache. Ailes plus ou moins enfumées, les nervures noires. Pattes entièrement rousses, les jambes postérieures avec leurs tarses légèrement lavés de brunâtre. Abdomen court, en ovale élargi, poli, brillant, noir, le 2e segment avec le 3e excepté au sommet, roux, le 1er segment avec une protubérance au milieu. Tarière de la longueur de l'abdomen environ.

Voisin du *lutus*, mais s'en séparant par ses pattes entièrement rouges, son abdomen noir à bande rousse et son thorax de même que la tête sans aucune tache de jaune. Examiné 1 ♂ et 2 ♀.

Gen. OPIUS, Wesm. XII p. 164.


A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :


Abdomen rouge à l'extrémité..... 1. *pallipes*,

Abdomen tout noir..... 2. *politus*, nov. sp.

2. *Opius* poli. *Opius politus*, nov. sp.

♂—Long. .12 pce. Noir avec les pattes rousses ; la bouche avec les 2 articles de la base des antennes roux. Ecailles alaires blan-





COOK'S TOURS
TO
EGYPT, THE NILE,
PALESTINE,
TURKEY, GREECE, ITALY &c.

By J. COOK, Esq.

